

**Caractéristiques :**

**Couleur fleur :** Blanc

**Couleur feuillage :** Bleuté

**Hauteur :** 100 cm

**Feuillaison :** Avril - Novembre

**Floraison(s) :** Août - Octobre


**Type de feuillage :** caduc

**Exposition :** soleil

**Type de sol :** sec et frais.

**Silhouette :** Touffe hérissée

**Densité :** 6 au m<sup>2</sup>

**ANDROPOGON ternarius****Barbon fendu**

-> [Accéder à la fiche de ANDROPOGON ternarius sur www.lepage-vivaces.com](http://www.lepage-vivaces.com)

**DESCRIPTION****Informations botaniques**

Nom botanique : ANDROPOGON ternarius

Famille : POACEAE

**Description de ANDROPOGON ternarius**

L'ANDROPOGON ternarius, Splitbeard dans sa région d'origine ou barbon fendu en français, est original par sa floraison ressemblant à des pinceaux. Sa touffe hérissée est très décorative, surtout en fin d'été ou en début d'automne, quand son feuillage vert bleuté devient rouille et se pare d'épillets plumeux argentés.

**Entretien de ANDROPOGON ternarius**

Tailler les parties sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives et au plus tard avant le démarrage de la végétation en fin d'hiver.

**EMPLACEMENT****Emplacement de ANDROPOGON ternarius**

EL1 - Espace libre sec

EL2 - Espace libre frais

**Type de sol de ANDROPOGON ternarius**

sol sec et frais.

**PARTICULARITÉ**

ANDROPOGON ternarius s'utilise pour ses fleurs et/ou son feuillage.

ANDROPOGON ternarius s'utilise en fleur coupée.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE**

ANDROPOGON ternarius n'est pas toxique.

-> [Accéder à la collection des Graminées disponible à la vente sur www.lepage-vivaces.com](http://www.lepage-vivaces.com)