

Caractéristiques :

Couleur fleur : Rouge
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 70 cm
Feuillaison : Mars - Novembre
Floraison(s) : Mai - Juillet
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : sec et frais.
Silhouette : Rosette
Densité : 6 au m²



TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'

Tanaisie - Pyrèthre

-> [Accéder à la fiche de TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' sur www.lepage-vivaces.com](http://www.lepage-vivaces.com)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'
 Famille : ASTERACEAE

Description de TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'

Leur floraison printanière est aussi estimée en plates-bandes que pour la fleur coupée. Sol fertile, sec ou frais. Massif.

Fleurs simples rouges à cœur jaune.

Entretien de TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'

Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Tailler et nettoyer la touffe en fin d'hiver.

EMPLACEMENT

Emplacement de TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'

EL1 - Espace libre sec
 EL2 - Espace libre frais
 PB - Plate-bande (sol sec, frais ou humide)

Type de sol de TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'

sol sec et frais.

PARTICULARITÉ

TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' supporte les sols calcaires.
 TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' s'utilise principalement pour ses fleurs.
 TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' s'utilise en fleur coupée.
 TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' supporte le climat maritime.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' n'est pas toxique.

-> [Accéder à la collection des Plantes Vivaces disponible à la vente sur www.lepage-vivaces.com](http://www.lepage-vivaces.com)