

**Caractéristiques :**

**Couleur fleur :** Rouge  
**Couleur feuillage :** vert  
**Hauteur :** 70 cm  
**Feuillaison :** Mars - Novembre  
**Floraison(s) :** Mai - Juillet  
**Type de feuillage :** caduc  
**Exposition :** soleil  
**Type de sol :** sec et frais.  
**Silhouette :** Rosette  
**Densité :** 6 au m<sup>2</sup>

**TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'****Tanaisie - Pyrèthre**

-> [Accéder à la fiche de TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' sur www.lepage-vivaces.com](http://www.lepage-vivaces.com)

**DESCRIPTION****Informations botaniques**

Nom botanique : TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'  
Famille : ASTERACEAE

**Description de TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'**

Leur floraison printanière est aussi estimée en plates-bandes que pour la fleur coupée. Sol fertile, sec ou frais. Massif.

Fleurs simples rouges à cœur jaune.

**Entretien de TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'**

Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Tailler et nettoyer la touffe en fin d'hiver.

**EMPLACEMENT****Emplacement de TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'**

EL1 - Espace libre sec  
EL2 - Espace libre frais  
PB - Plate-bande (sol sec, frais ou humide)

**Type de sol de TANACETUM coccineum 'Robinson's Red'**

sol sec et frais.

**PARTICULARITÉ**

TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' supporte les sols calcaires.  
TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' s'utilise principalement pour ses fleurs.  
TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' s'utilise en fleur coupée.  
TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' supporte le climat maritime.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE**

TANACETUM coccineum 'Robinson's Red' n'est pas toxique.

-> [Accéder à la collection des Plantes Vivaces disponible à la vente sur www.lepage-vivaces.com](http://www.lepage-vivaces.com)