

Caractéristiques :

Couleur fleur : Blanc

Couleur feuillage : Bleuté

Hauteur : 100 cm

Feuillaison : Avril - Novembre

Floraison(s) : Août - Octobre



Type de feuillage : caduc

Exposition : soleil

Type de sol : sec et frais.

Silhouette : Touffe hâ©rissâ©e

Densité : 6 au m²



ANDROPOGON ternarius

Barbon fendu

-> [Accéder à la fiche de ANDROPOGON ternarius sur www.lepage-vivaces.com](http://www.lepage-vivaces.com)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : ANDROPOGON ternarius

Famille : POACEAE

Description de ANDROPOGON ternarius

L'ANDROPOGON ternarius, Splitbeard dans sa région d'origine ou barbon fendu en français, est original par sa floraison ressemblant à des pinceaux. Sa touffe hérissée est très décorative, surtout en fin d'été ou en début d'automne, quand son feuillage vert bleuté devient rouille et se pare d'épillets plumeux argentés.

Entretien de ANDROPOGON ternarius

Tailler les parties sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives et au plus tard avant le démarrage de la végétation en fin d'hiver.

EMPLACEMENT

Emplacement de ANDROPOGON ternarius

EL1 - Espace libre sec

EL2 - Espace libre frais

Type de sol de ANDROPOGON ternarius

sol sec et frais.

PARTICULARITÉ

ANDROPOGON ternarius s'utilise pour ses fleurs et/ou son feuillage.

ANDROPOGON ternarius s'utilise en fleur coupée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

ANDROPOGON ternarius n'est pas toxique.

-> [Accéder à la collection des Graminâ©es disponible à la vente sur www.lepage-vivaces.com](http://www.lepage-vivaces.com)